



Avertissements Agricoles®

Edition
Ile de France - Centre

BONNES PRATIQUES AGRICOLES

Bulletin Technique des Stations d'Avertissements Agricoles

ISSN 1148-4055
BULLETIN TECHNIQUE N° 11 (2 pages)

N° D'ORDRE : 028
28 Avril 1997

POMMIER : Tavelure : Contaminations graves le week-end dernier.
POMMIER-POIRIER : Carpopapse : Attendre pour traiter.

POMMIER

TAVELURE

Les pluies des 25, 26 et 27 avril ont entraîné des projections importantes et des contaminations graves. En effet, dans toutes les situations, près de 70 % du stock projetable a été libéré, ce qui représente une quantité très importante.

➤ *Comme indiqué dans le précédent bulletin, il fallait, dans la mesure du possible, positionner un traitement préventif avant les pluies. Si cela n'a pas été fait un traitement curatif est nécessaire le plus tôt possible.*

Si vous avez positionné un préventif, il est souhaitable de faire un second passage rapidement avec un curatif. En effet les projections occasionnées par les pluies ont été très importantes et il est probable qu'un simple préventif ne suffise pas, même s'il n'a pas été totalement lessivé par les pluies.

Le passage pluvieux semble s'arrêter à partir de mercredi : en l'absence de pluie, il n'y a pas de risque de nouvelles projections.

Cependant, le stock projetable se reconstitue rapidement; s'il pleut à nouveau en fin de semaine, il y aura un risque de contaminations assez graves. Dans ce cas, maintenir une protection efficace.

PUCERONS

Des pucerons cendrés sont observés à Chouzé (37), Parçay-Meslay (37) et Charentilly (37).

➤ *Surveiller ces pucerons sur vos parcelles et intervenir s'ils sont présents (voir bulletins précédents).*

POMMIER-POIRIER

CARPOCAPSE

Il y a une erreur dans la liste des produits fournies dans le bulletin n° 7 du 25/03/97. Le CASCADE est un **ovicide** et non un larvicide (Homologation uniquement sur pommier).

Avec la remontée des températures du 24 et 25 avril des captures ont été enregistrées le 25/04 dans le Loiret à St Cyr en Val (1 pour 5 pièges), à Sigloy (9 pour 4 pièges) et à Fleury (4 pour 1 piège). Par ailleurs, 3 papillons sont sortis le 25 avril dans l'élevage à Fleury; aucune ponte n'a été observée.

Les températures de ce début de semaine étant plus fraîches, aucune ponte ne devrait avoir lieu pour l'instant.

➤ *Attendre pour positionner un éventuel traitement ovicide.*

CASSISSIER

PHYTOPTE DU GROS BOURGEON

Avec l'augmentation des températures en fin de semaine dernière, les sorties sont en recrudescence.

➤ *Renouveler la protection.*

AUXILIAIRES DES VERGERS

Ils sont de plus en plus présents. Ces prédateurs s'attaquent à divers ravageurs.

Coccinelles :

- Stéthorus : acariens.
- Autres : pucerons.

Punaies :

- Orius : acariens, thrips, jeunes chenilles, pucerons...
- Anthocoris et Mirides : larves de psylles.

Chrysopes et Hémérobès : Larves de pucerons, psylles, jeunes chenilles, acariens, cochenilles.

Description de ces auxiliaires en page 2.

ARBORICULTURE

© SPV. Toute reproduction, totale ou partielle, est soumise à notre autorisation - Directeur Gérant : J. BOULUD - CPPAP N° 536 AD




D.R.I.A.F. ILE DE FRANCE
Service Régional de la Protection des Végétaux
10 rue du Séminaire - 94516 RUNGIS CEDEX
Tél. 01.41.73.48.00 - Fax 01.41.73.48.48


D.R.A.F. CENTRE
Service Régional de la Protection des Végétaux
BP 210 - 45403 FLEURY LES AUBRAIS CEDEX
Tél. 02.38.22.11.11 - Fax 02.38.84.19.79

P61


PUNAISES PREDATRICES




Orius (3-4 mm)




Anthocoris (5 mm)




Heterotoma
(larve rouge puis brune)



Deraeocoris lutescens
(4-5 mm - marron)




Deraeocoris ruber
(larve rouge, antennes rouges
et blanches)




Pilophorus
(larve rouge puis brune)
(4 mm environ au dernier stade)

COCCINELLES




Larve




Stethorus
(petite coccinelle noire)

STAPHYLIN



CHRYSOPE



Larve

SYRPHE



Larve

HYMENOPTERE

